

Núcleos para **BOVINOS, SUÍNOS E AVES**



Soma
Nutrição Animal

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS



LINHA BOVINOS

RIVERMILK CRIA

||||| SKU: 25kg

Indicação de uso: Núcleo indicado para bezerras (os) em fase de aleitamento.

Modo de Uso: Incluir 50kg / tonelada (5%) do núcleo na mistura do concentrado.

Consumo esperado: 50g de núcleo / bezerra / dia.

RIVERMILK BIOTAMP/VM

||||| SKU: 25kg

Indicação de uso: Núcleo tamponado indicado para fabricação de ração para animais de alta produção.

Modo de Uso: Incluir 50kg/tonelada (5%) do núcleo na mistura do concentrado.

Consumo esperado: 500g de núcleo / vaca / dia.

RIVERMILK PRO CASCO

||||| SKU: 20kg

Indicação de uso: Núcleo indicado para fabricação de ração para animais de alta produção.

Modo de Uso: Incluir 40 kg / tonelada (4%) do núcleo na mistura do concentrado.

Consumo esperado: De 300 a 400 g de núcleo / vaca / dia.



LINHABOVINOS

RIVERMILK GOLD/M

||||| SKU: 30kg

Indicação de uso: Núcleo indicado para fabricação de ração para vacas em lactação e animais em recria.

Modo de Uso:

• **Vacas em lactação**

- Incluir 30kg/tonelada (3%) do núcleo na mistura do concentrado.

• **Novilhas**

- Incluir 40kg/tonelada (4%) do núcleo no concentrado formulado.

Consumo:

• **Vacas em lactação:** 300g de núcleo/dia.

• **Novilhas:** 60g de núcleo/dia.

RIVERMILK BOVINUTRI

||||| SKU: 30kg

Indicação de uso: Núcleo indicado para fabricação de ração para vacas em lactação e animais em recria.

Modo de Uso:

• **Vacas em lactação**

- Incluir 30kg/tonelada (3%) do núcleo na mistura do concentrado.

• **Novilhas**

- Incluir 40kg/tonelada (4%) do núcleo no concentrado formulado.

Consumo:

• **Vacas em lactação:** 300g de núcleo /dia.

• **Novilhas:** 60g de núcleo/dia.



LINHA BOVINOS

PRÉ ÂNION

||||||| SKU: 20kg

Indicação de uso: Núcleo aniônico indicado para fabricação de ração para animais de alta produção.

Modo de Uso: Incluir de 100kg a 150kg/tonelada (10% a 15%) do núcleo na mistura do concentrado.

Consumo: 400g de núcleo /vaca/dia

RIVERMILK EQUILÍBRIO COW

||||||| SKU: 20kg

Indicação de uso: Suplemento controlador de pH ruminal indicado para vacas em lactação e gado de corte confinado submetidos a dietas com alta inclusão de concentrado.

Modo de Uso: Incluir 0,75% do Rivermilk Equilíbrio Cow na matéria seca total da dieta ou adicionar 1,5 a 2,0% no concentrado, como forma de prevenir acidose ruminal;

Consumo esperado:

Vacas em Lactação: Fornecer de 150-250g/vaca/dia, variando de acordo com a intensidade de produção de leite e ingestão de concentrado;

Gado de Corte Confinado: Fornecer de 125-150g/animal/dia, variando de acordo com a intensidade de uso de concentrado;



LINHA BOVINOS

NÚCLEO @ CONFINA BOI

||||| SKU: 20kg

Indicação de uso: Núcleo indicado para fabricação de ração para bovinos de corte em confinamento ou semi-confinamento.

Modo de Uso: Incluir 40kg/tonelada (4%) do núcleo na mistura do concentrado.

Consumo: Machos e fêmeas em terminação: 200 a 300g/animal/dia

LINHA BOVINOS

TABELA COMPARATIVA DE NÍVEIS

NUTRIENTES	UNIDADE	Rivermilk Cria	Rivermilk Biotamp VM	Rivermilk Pro Casco	Rivermilk Gold/M	Rivermilk Bovinutri	Núcleo Pré Ânon	Rivermilk Equilíbrio Cow	@Confinar Boi
Cálcio (Mín.)	g/kg	160	140	180	210	220	100	180	180
Cálcio (Máx.)	g/kg	200	160	220	240	250	120	200	230
Fósforo (Mín.)	g/kg	55	40	50	55	40	20	-	20
Magnésio (Mín.)	g/kg	20	30	40	30	25	40	50	20
Sódio (Mín.)	g/kg	40	70	75	75	80	15	90	40
Vitamina A (Mín.)	UI/kg	180.000	250.000	300.000	225.000	225.000	380.000	-	120.000
Vitamina D3 (Mín.)	UI/kg	41.500	50.000	60.000	45.000	45.000	76.000	-	24.000
Vitamina E (Mín.)	UI/kg	1.000	1.300	1.500	1.000	1.000	4.000	-	500
Vitamina K3 (Mín.)	mg/kg	26,50	-	-	-	-	-	-	-
Vitamina B1 (Mín.)	mg/kg	20	-	-	-	-	-	-	-
Vitamina B2 (Mín.)	mg/kg	69	-	-	-	-	-	-	-
Vitamina B6 (Mín.)	mg/kg	37	-	-	-	-	-	-	-
Vitamina B12 (Mín.)	mcg/kg	180	-	-	-	-	-	-	-
Vitamina C (Mín.)	mg/kg	4.000	-	-	-	-	-	-	-
Niacina (Mín.)	mg/kg	420	-	-	-	-	-	-	-
Biotina (Mín.)	mg/kg	0,7	40	50	-	-	50	-	-
Colina (Mín.)	mg/kg	-	-	-	-	-	60	-	-
Ác. Pantotênico (Mín.)	mg/kg	127	-	-	-	-	-	-	-
Ác. Fólico (Mín.)	mg/kg	10,60	-	-	-	-	-	-	-
Manan oligossacarídeos (Mín.)	g/kg	10	2,52	3,00	-	-	-	-	5,00
Beta glucanos (Mín.)	g/kg	13	3,40	4,050	-	-	-	-	6,76
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.)	UFC/kg	-	-	1,5x10 ¹⁰	-	-	2,5x10 ¹⁰	-	-
Monensina	mg/kg	1.000	450	700	1.000	-	700	-	750
Virginiamicina	mg/kg	-	450	-	-	-	-	-	-
Minerais orgânicos		✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Adsorvente de micotoxina		-	✓	✓	-	-	✓	-	✓



LINHA BOVINOS

	Milho moido	Farelo de soja	Núcleo	
NC Rivermilk Cria	62%	33%	5%	20% PB
NC Rivermilk Biotamp/VM	50%	45%	5%	24% PB
NC Rivermilk Pro Casco	51%	45%	4%	24% PB
NC Rivermilk Gold/M	59%	38%	3%	22% PB
NC Rivermilk Bovinutri	59%	38%	3%	22% PB
NC Biopass 500	51%	44%	5%	24% PB
NC Pré Ânion	43%	45%	12%	24% PB
NC @ Confinar Boi	76%	20%	4%	15% PB

Batida para 500kg

	Milho moido	Farelo de soja	Núcleo	
NC Rivermilk Cria	310kg	165kg	25kg	20% PB
NC Rivermilk Biotamp/VM	250kg	225kg	25kg	24% PB
NC Rivermilk Pro Casco	255kg	225kg	20kg	24% PB
NC Rivermilk Gold/M	295kg	190kg	15kg	22% PB
NC Rivermilk Bovinutri	295kg	190kg	15kg	22% PB
NC Biopass 500	255kg	220kg	25kg	24% PB
NC Pré Ânion	215kg	225kg	60kg	24% PB
NC @ Confinar Boi	380kg	100kg	20kg	15% PB

Para mais sugestões de formulação ou qualquer dúvida relacionada aos produtos Soma procure seu Representante local ou o time técnico da Soma.



LINHASUÍNOS

TABELA COMPARATIVA DE NÍVEIS

SKU		Suíno inicial	Suíno crescimento	Suíno terminação	Suíno reprodução
INDICAÇÃO DE USO		Suínos na fase inicial II, de 51 dias a 70 dias de idade	Suínos na fase de crescimento, de 71 dias a 110 dias de idade.	Suínos na fase de terminação, de 111 dias de idade até o abate.	Matrizes em gestação ou em fase de lactação
MODO DE USO		Incluir 40 kg/tonelada ou (4%) do núcleo na mistura do concentrado.	Incluir 40 kg/tonelada ou (4%) do núcleo na mistura do concentrado.	Incluir 40 kg/tonelada ou (4%) do núcleo na mistura do concentrado.	Incluir 40 kg/tonelada ou (4%) do núcleo na mistura do concentrado.
Cálcio (Mín.)	g/kg	190	100	175	175
Cálcio (Máx.)	g/kg	230	150	220	225
Fósforo (Mín.)	g/kg	50	19	17	45
Vitamina A (Mín.)	UI/kg	250.000	150.000	150.000	250.000
Vitamina D3 (Mín.)	UI/kg	50.000	37.500	37.500	50.000
Vitamina E (Mín.)	UI/kg	1.250	375	375	1.250
Vitamina K3 (Mín.)	mg/kg	50	37,5	37,5	50
Vitamina B1 (Mín.)	mg/kg	50	33,75	33,75	50
Vitamina B2 (Mín.)	mg/kg	150	100	100	150
Vitamina B6 (Mín.)	mg/kg	75	50	50	75
Vitamina B12 (Mín.)	mcg/kg	750	500	500	750
Ácido Fólico (Mín.)	mg/kg	75	15	15	75
Ácido Pantotênico (Mín.)	mg/kg	250	233	233	250
Biotina (Mín.)	mg/kg	5	2	2	5
Niacina (Mín.)	mg/kg	750	500	500	750
Colina (Mín.)	mg/kg	1.400	2.500	1.800	10.000
Lisina (Mín.)	g/kg	14,75	-	-	-
Fitase (Mín.)	FTU/kg	12.500	12.500	12.500	12.500
Avilamicina	mg/kg	500	-	-	-
Bacitracina de Zinco	mg/kg	-	1.375	700	-



LINHASUÍNOS

SUGESTÃO DE FORMULAÇÃO

Sugestões de fórmulas de rações com o Núcleo da Soma para suínos.

	Inicial	Crescimento	Terminação	Gestação	Lactação
Farelo de soja	35	28	20	14	27
Fubá	61	68	76	57	63
Farelo trigo	-	-	-	25	6
NC soma suíno inicial	4	-	-	-	-
NC soma suíno crescimento	-	4	-	-	-
NC soma suíno terminação	-	-	4	-	-
NC soma suíno reprodução	-	-	-	4	4
Total(kg)	100	100	100	100	100
Proteína Bruta (%)	20,5	18	15,4	15	18
Fases de fornecimento	51 dias a 70 dias de idade	71 dias a 110 dias de idade	111 dias até o abate	matrizes em gestação e pré-parto	matrizes em lactação e reposição

Para mais sugestões de formulação ou qualquer dúvida relacionada aos produtos Soma procure seu Represente local ou o time técnico da Soma.

LINHA AVES

TABELA COMPARATIVA DE NÍVEIS

		TEC AVES I/C	TEC AVES POSTURA
SKU		20kg	20kg
INDICAÇÃO DE USO		Aves na fase inicial e crescimento	Aves na fase de postura
MODO DE USO		Inicial: Para aves de corte e postura de 01 a 21 dias, incluir 50 kg/ton (5%). Crescimento: Para aves de corte e postura em crescimento, a partir dos 21 dias de idade até o abate ou primeira postura, respectivamente, incluir 40 kg/ton (4%).	Para aves de postura, do início da produção de ovos até o descarte das aves, incluir 40 kg/ton (4%).
Cálcio (Mín.)	g/kg	165	220
Cálcio (Máx.)	g/kg	220	320
Fósforo (Mín.)	g/kg	45	55,6
Vitamina A (Mín.)	UI/kg	220.000	220.000
Vitamina D3 (Mín.)	UI/kg	55.000	55.000
Vitamina E (Mín.)	UI/kg	420	420
Vitamina K3 (Mín.)	mg/kg	53	53
Vitamina B1 (Mín.)	mg/kg	40	40
Vitamina B2 (Mín.)	mg/kg	138	138
Vitamina B6 (Mín.)	mg/kg	74	74
Vitamina B12 (Mín.)	mcg/kg	360	360
Ácido Fólico (Mín.)	mg/kg	21	21
Ácido Pantotênico (Mín.)	mg/kg	254	254
Biotina (Mín.)	mg/kg	1,40	1,40
Niacina (Mín.)	mg/kg	840	840
Colina (Mín.)	mg/kg	7.000	6.000
Fitase (Mín.)	FTU/kg	12.500	7.500
Salinomicina	mg/kg	1.500	-
Avilamicina	mg/kg	104	-
Bacitracina de Zinco	mg/kg	-	700



LINHA **AVES**

SUGESTÃO DE FORMULAÇÃO

Sugestões de fórmulas de rações com o Núcleo da Soma para aves.

	Inicial	Crescimento	Postura
Farelo de soja	40	32	26
Milho moído	55	64	63
Calcário calcítico	-	-	7
NC Tec Aves I/C	5	4	-
NC Tec Aves Postura	-	-	4
Total(kg)	100	100	100
Proteína Bruta (%)	22	19	17
Fases de fornecimento	1 a 21 dias	Corte: 22 dias até abate Postura: 22 até 1ª postura	1ª postura até o abate

Para mais sugestões de formulação ou qualquer dúvida relacionada aos produtos Soma procure seu Represente local ou o time técnico da Soma.



Soma

Nutrição Animal



somanutricaoanimal.com.br



contato@somanutricaoanimal.com.br



[somanutricaoanimal](https://www.instagram.com/somanutricaoanimal)



SAC-0800 0331453